



Censimento Studi
-
Gruppo di Studio AIRO
Testa Collo

2014

Studi Nazionali

Studio clinico multicentrico, open label, randomizzato di fase II di confronto fra Cetuximab e radioterapia versus Cisplatino e radioterapia nel trattamento di I linea di pazienti con carcinoma squamoso localmente avanzato del distretto testa-collo (LA-HNSCC) prot. CTXMAB + RT.

Coordinatore

- Prof. Magrini (Brescia)

Centri
Partecipanti

- Arezzo (Ponticelli-Lastrucci)
- Brescia (Magrini-Buglione)
- Firenze (Paia)
- Genova IST (Corvò- Bacigalupo)
- Pistoia (Stefanacci)
- Prato (Polli)
- Siena (Crociani-Pirtoli)
- Torino (Ricardi)

Studi Nazionali

Studio randomizzato sugli effetti benefici LACTOBACILLUS BREVIS CD2 nella prevenzione delle mucositi orali indotte da radiochemioterapia nei tumori del testa-collo.

Coordinatore

- Dott.ssa De Sanctis (Roma S. Andrea)

Centri
Partecipanti

- Genova IST (Corvò-Bacigalupo)
- Ivrea (Cante)
- Napoli Pascale (Argenone)
- Orbassano (Redda)
- Pesaro (Bunkheila-Maurizi)
- Roma Fratebenefratelli Isola Tiberina (Caspiani-Marmiroli)
- Roma S. Andrea (Maurizi-De Sanctis)

Studi Nazionali

INTERCEPTOR

Chemioterapia di induzione seguita da radioterapia radicale + cetuximab verso chemio-radioterapia nel carcinoma squamoso della testa-collo localmente avanzato. Studio di fase III randomizzato.

Coordinatore

- Dott. Merlano (Cuneo)

Centri
Partecipanti

- Alessandria
- Aosta
- Cuneo (Russi)
- Genova IST (Corvò-Bacigalupo)
- Torino (Ricardi)

Studi Nazionali

Studio osservazionale retrospettivo sulla terapia antimicotica orale in pazienti immunodepressi con episodio di candidosi orofaringea (OPC): appropriatezza terapeutica ed effetti di prevenzione post-trattamento chemio-radioterapico.

Coordinatore

- Prof. Corvò (Genova IST)

Centri
Partecipanti

- Ascoli Piceno-Macerata (Giannini)
- Chieti (Di Pilla)
- Genova IST (Corvò-Bacigalupo)
- Napoli Pascale (Argenone-Ravo)
- Taranto (Silvano-Soloperto)

Studi Nazionali

Multicenter Randomized Open Trial to Evaluate Efficacy of Fentanyl Pectin Nasal Spray vs Physician Choice-Usual Care in Reducing Incidental Predictable Breakthrough Pain at Swallowing in Head/Neck Cancer Patients Undergoing Radiotherapy.

Coordinatore

- **Dott.ssa Licitra (Milano Istituto Nazionale Tumori)**

Centri
Partecipanti

- Meldola (Parisi)
- Milano IEO (Alterio)
- Milano Istituto Nazionale Tumori
- Torino Candiolo
- Treviso (Gava)

Altri Studi

Centro	Referente	Studio
Roma Gemelli	Miccichè	A multicenter randomized open trial to evaluate the efficacy of fentanyl pectin nasal spray (FPNS) versus Physician Choice (PC) - Usual Care (UC), in reducing incidental predictable breakthrough pain (IP-BTP) at swallowing in patients with head and neck cancer undergoing radiotherapy EUDRACT N° 2013-001271-20.
Roma Gemelli Milano IEO	Miccichè Alterio	A randomized, double blind, placebo-controlled, phase III study to evaluate the efficacy and safety of afatinib (BIBW 2992) as adjuvant therapy after chemo-radiotherapy in primary unresected patients with stage III, Iva, or IV b loco-regionally advanced head and neck squamous cell carcinoma. EUDRACT N° 2011-000392-14.
Milano IEO	Alterio	Multicenter, randomized, Double-blind, placebo controlled study to evaluate the COADIUVANT ACTIVITY of ginger (Zingiber officinalis) IN THE MANAGEMENT OF NAUSEA in patients receiving high emetogenic treatments.

Altri Studi

Centro/i	Referente/i	Studio
Roma IFO	Sanguineti	Valutazione precoce della risposta alla (chemio)radioterapia definitiva con RM multiparametrica nei SCC III e IV stadio (studio di fase II).
Roma IFO Milano IEO Genova IST	Sanguineti Alterio Bacigalupo	Raccolta dati prospettica sulla tox acuta e tardiva in pazienti sottoposti a chirurgia conservativa sulla laringe e RT post operatoria con IMRT (studio osservazionale multicentrico).
Roma IFO	Sanguineti	Riduzione della mucosite con FARINGEL (studio randomizzato in doppio cieco).
Roma IFO	Sanguineti	IORT nella re-irradiazione dei tumori testa e collo rioperati (studio di fase I-II).
Milano IEO	Alterio	Frazionamento Accelerato Modulato nel trattamento SIB-IMRT dei tumori della testa e del collo (FAMOSO).

Altri Studi

Centro	Referente/i	Studio
Torino Candiolo		Fase II dose escalation con Tomoterapia.
Torino Candiolo		Fase II ritrattamento con Tomoterapia
Torino Candiolo		Prevenzione tossicità cutanea con crema topica vs medicazione al bisogno.
Torino Università		Studio monocentrico glutamina per prevenzione mucosite.